

---

# PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

## Schamlippenvergrößerung mit Eigenfett

Ein Volumenverlust der äusseren Schamlippen wird im Alter oder nach hormonellen Umstellungen durch viele betroffene Frauen als störend empfunden.

Das Lipofilling stellt hier eine gute Lösung zur Wiederherstellung des Volumens dar. Beim Lipofilling wird körpereigenes Fett abgesaugt und in Regionen eingebracht, wo mehr Volumen (Mikrofett) gewünscht wird. Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, das zu natürlichen und langanhaltenden Ergebnissen führt. Zusätzlich können störende Fettdepots eliminiert werden.

### FRAGEN:

- WIE VIEL VOLUMEN KANN AUF EINMAL EINGEBRACHT WERDEN?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEN IST?
- GIBT ES ALTERNATIVEN ZUM EIGENFETT-TRANSFER?

### KURZINFO:

Anästhesie: Lokalanästhesie oder Dämmerschlaf

OP Dauer: 45 Minuten

OP Setting: ambulant

Arbeitsunfähigkeit: 4 Tage

Sport Karenz: 3 Wochen