
PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

Untere Blepharoplastik

Laxe und überschüssige Haut sowie Tränensäcke sind Zeichen des Alterungsprozesses. Die Veränderungen führen zu einem müden und traurigen Blick.

Bei einer unteren Blepharoplastik ist es das Ziel einerseits das Fettgewebe welches für die Tränensäcke verantwortlich ist zu resezieren bzw. umzuverteilen, andererseits wird die überschüssige Unterlidhaut reseziert. Der Hautschnitt erfolgt meist im Bereich der Schleimhaut des Unterlides (transkonjunktival). Sollte eine Resektion überschüssiger Haut erforderlich sein, wird der Schnitt knapp unterhalb der Wimpern gesetzt (subziliär).

FRAGEN:

- WO WIRD DIE NARBE PLATZIERT SEIN?
- BESTEHT GEFahr, DASS MEINE SEHKRAFT DURCH DIESE OPERATION BEEINTRÄCHTIGT WIRD?
- KANN DIE OPERATION MIT LIPOFILLING IM BEREICH DER UNTERLIDER KOMBINIERT WERDEN?
- WIE LANGE BIN ICH NACH DER BEHANDLUNG NICHT

KURZINFO:

Eingriff in Allgemeinanästhesie

OP-Dauer: 120 Minuten

Ambulanter Aufenthalt

Arbeitsunfähigkeit: 2 Tage

Sport nach 2 Wochen möglich